

A vizsgálat rövid leírása

A vizsgálat vagy a csuklónál található, un. radiális ütőéren, vagy az ágyékból lefutó un. femoralis (comb) ütőéren keresztül végezzük. Kérjük, előre jelezze, ha ezzel kapcsolatban bármilyen kívánsága van. Ha az un. radiális behatolásra kerül sor, akkor Ön már kb. 6 óras megfigyelési periódust követően elbocsátásra kerül, természetesen csak akkor, ha nem kerül sor tágításra. Amennyiben femoralis behatolásból végezzük a vizsgálatot, abban az esetben kb. 6-12 órán keresztül kell feküdni, függetlenül attól, hogy volt-e tágítás vagy nem.

Maga a koszorúérfestés ugyanúgy történik, mindkét behatolás esetén magas jód tartalmú érfestéket (kontrasztanyagot) fecskendezünk a koszorúserekbe. A látott kép alapján döntünk a gyógyszeres terápia, tágítás vagy szívsebészeti beavatkozás elvégzése mellett, az Ön véleményét és a szakmai szempontokat szem előtt tartva. A vizsgálat befejezésekor a kanült (csövet) eltávolítjuk. A beavatkozást követően kb. 3-4 l folyadékot kell fogyasztani, hogy az érfesték kiürüljön a szervezetből. A további teendőket a coronarographiát végző orvos, asszisztens és az osztályon dolgozó nővérek fogják elmondani Önnek.