

Röviden a vizsgálat a következőképpen történik:

- 1) Az Echo-laborban bal oldalfekvésben elsőként egy EKG monitort csatlakoztatunk a hátra, amivel az egész vizsgálat alatt folyamatosan regisztráljuk a szív elektromos tevékenységét
- 2) Ha megelőzően nem volt szokványos TTE vizsgálata, egy rövid transthoracalis echo történik a TEE-t megelőzően.
- 3) Intravénás katétert helyezünk a jobb v. a bal alkarvénába, amin keresztül majd az összes szükséges gyógyszert be lehet adni.
- 4) Egy speciális légzés monitorozó gépet (pulse-oxyméter) csatlakoztatunk az ujjára vagy a fölére.
- 5) Vérnyomásmérés következik, és ha szükséges folyamatos vérnyomás ellenőrzést folytatunk.
- 6) Lidocain spray-vel érzéstelenítjük a szájüreg bizonyos részeit. Az esetleges lidocain allergiát még ez előtt feltétlenül közölje a vizsgálóval!
- 7) Beadjuk az altató/nyugtató injectiót (Dormicum). Ne felejtse el közölni, ha bármilyen egészségügyi problémája kontraindikálja a az altatószerek használatát!
- 8) Harapásgátlót helyezünk a szájba, miután minden kivehető protézist eltávolítottunk.
- 9) Az orvos ezt követően megkéri, hogy segítse az endoscop levezetését néhány nyeléssel. Ha már a műszer a nyelőcsőben van, néhány mély lélegzettel meggyőződhet róla, hogy jól kap levegőt, ezt követően a legtöbb beteg nyugalomban fekszik a vizsgálat befejeztéig.
- 10) A vizsgálat végén, ha szükséges, az altató hatását felfüggesztő injectiót kap.
- 11) Miután véget ért a vizsgálat a torka még kb. másfél óráig érzéketlen marad. Arra kérjük, hogy ne egyen vagy igyon ez idő alatt semmit, mivel a félrenyelés veszélye nagy. Ha eltelt az idő, pár korty hideg vízzel kipróbálhatja, hogy az érzéstelenítő hatása elmúlt-e. Ha érzi a hideg vizet mikor lenyelte, fogyaszthat bármit.

Ha bármilyen kérdés merülne fel, forduljon orvosához, vagy hívja az Echocardiográfiás laboratóriumot.